

**CWS – Empfehlung für Kontrolluntersuchungen
bei lokalisierten embryonalen Rhabdomyosarkomen >5cm oder lokalisierte
alveoläre Rhabdomyosarkome)**

Patient:

Zeitpunkt	Untersuchungen im Bereich der Primärlokalisierung	Staging	Zusätzliche Untersuchungen
im 1. Jahr nach Therapieende	Sonografie (Tumorregion, regionale Lymphknoten, Abdomen, Pelvis) MRT/CT mit Kontrastmittel (alle 4 Monate ; möglichst alternierend)	Rö-Thorax oder CT Thorax (Intervalle risikoadaptiert, mind. alle 6 Monate) Sonografie Abdomen/Pelvis (mind. alle 6 Monate)	Leber- und Nierenfunktion (glomerulär und tubulär) Echokardiogramm/ 24h-EKG
2. Jahr	siehe oben, alle 6 Monate	s.o., Rö-Thorax alle 6 Monate Sonografie Abdomen/Pelvis (mind. alle 6 Monate)	Hormonstatus (Wachstum und Pubertätsentwicklung)
3.-5.- Jahr	siehe oben, alle 6-12 Monate	siehe oben, jährlich	Funktionelle Beeinträchtigung (Kontinenz, Seh- u. Hörvermögen; muskuloskelettales System)
nach dem 5. Jahr	Sonografie (s.o.) MRT/CT mit Kontrastmittel (Häufigkeit nach Einschätzung des verantwortlichen Arztes)	siehe oben, (Häufigkeit nach Einschätzung des verantwortlichen Arztes)	Weitere Untersuchungen in Abhängigkeit der klin. Symptomatik

Quelle: CWS-Guidance