

**CWS – Empfehlung für Kontrolluntersuchungen
bei Weichteilsarkomen (außer lokalisierte Rhabdomyosarkome)**

Patient:

| Zeitpunkt | Untersuchungen im Bereich der Primärlokalisierung | Staging | Zusätzliche Untersuchungen |
|-------------------------------------|---|---|---|
| im 1. Jahr nach Therapieende | Sonografie (Tumorregion, regionale Lymphknoten, Abdomen, Pelvis) MRT/CT mit Kontrastmittel (alle 4 Monate ; möglichst alternierend) | Rö-Thorax oder CT Thorax (Intervalle risikoadaptiert, mind. alle 6 Monate) Sonografie Abdomen/Pelvis (mind. alle 6 Monate) Knochenszintigrafie (risikoadaptiert, einmal jährlich) <u>Bei Stadium IV: MRT/CT-Beurteilung von Metastasen</u> | Leber- und Nierenfunktion (glomerulär und tubulär) Echokardiogramm/ 24h-EKG Hormonstatus (Wachstum und Pubertätsentwicklung) |
| 2. Jahr | siehe oben, alle 6 Monate | s.o., Rö-Thorax alle 6 Monate Sonografie Abdomen/Pelvis (mind. alle 6 Monate) | Funktionelle Beeinträchtigung (Kontinenz, Seh- u. Hörvermögen; muskuloskelettales System) |
| 3.-5.- Jahr | siehe oben, alle 6-12 Monate | siehe oben, jährlich | |
| nach dem 5. Jahr | Sonografie (s. o.) MRT/CT mit Kontrastmittel (Häufigkeit nach Einschätzung des verantwortlichen Arztes) | siehe oben, (Häufigkeit nach Einschätzung des verantwortlichen Arztes) | |

Quelle: CWS-Guidance